

Ozimá pšenice – nejranější odrůdy začínají metat, ale většina porostů má praporcový list.



Nyní je nejvhodnějším čas pro preventivní fungicidní zásah aplikací **Soligor 0,7lt/ha, Doctor 0,8-1,0lt/ha, Mizona 1lt/ha nebo Libraxu 1,0lt/ha** či jejich kombinacemi např. **velmi dobré varianty Mizona 0,5lt/ha + Doctor 0,5lt/ha**. Předešlé srážky, husté porosty a vyšší teplota vytváří ideální podmínky pro šíření braničnatek, padlí, rzí a jiných listových chorob, které je třeba řešit preventivně protože se špatně zastavují. Mizona i Doctor mají dlouhé systémové působení, chrání nové přírůstky, rychle pronikají do rostliny, a proto je lze aplikovat i za chladného a vlhkého počasí.

Společně s fungicidem by měla být spojena aplikace i insekticidu Karis Max 0,08 lt/ha nebo Rafan Max, oba v dávce 0,05lt/ha proti kohoutkům, obalečům, mšicím a jiným škůdcům.

Karis Max nepodléhá hlášení včelařům!

V porostech se již začaly líhnout larvy kohoutků, ale současně lze velmi snadno najít i jiné škůdce – hlavně mšice!



Kukuřice – kukuřice vlivem chladna jen pomalu urůstaly, komu chladno nevadilo byly spíš plevelé. Plevelé dokázaly vytvořit souvislé koberce a ty již silně konkurovaly kukuřici. Proto bylo na některých plochách přistoupeno k **dělené aplikaci novinky Principalu Forte 240g/ha + smáčedlo Šaman 0,4lt/ha nebo 0,1% Vivolt, kdy tato první dávka se aplikuje ve 3-4 listech kukuřice**. Principal Forte hubí velmi rychle kompletní spektrum plevelů, takže již druhý den po aplikaci je vidět na plevelích účinnost. **Je to zcela nový přípravek, který obsahuje safener a je registrován až do fáze 9 listů kukuřice!**

Ceníková cena hektarového ošetření Principalem Forte je cca 1780,-Kč včetně smáčedla Šaman! Principal Forte má jen velmi omezená rezidua – což je výhoda, protože neomezuje následné plodiny, ale v případě rozvleklého vzcházení plevelů lze společně s Principalem Forte aplikovat i reziduální Balaton Plus 1,5lt/ha. Kukuřice po odstranění první vlny plevelů bude rychle odrůstat a pokud bude třeba dohubit následně vzešlé plevely lze Principal forte opět 240g/ha aplikovat podruhé – čím dohubíme později vzešlé ježatky a jiné plevely. **Tuto druhou aplikaci uskutečníme v době, kdy naznáme, že plevely jsou již vzešlé. Kukuřice může mít 6-9 listů.**



Prvně seté a stále neošetřené **porosty se však rychle dostávají do fáze 5-6 listů, kdy plevely jsou opravdu již velké. Tady je již čas pro aplikaci ověřených kombinací jako je Equip**

Ultra 1,5lt/ha + Story 0,3 lt/ha nebo nově Principal Forte 480g/ha se smáčedlem Šaman. Obě kombinace zasáhnou celé spektrum i přerostlých dvouděložných plevelů (merlík, řepka, rdesna, pohanka, pcháč...) ale i trávovitých plevelů (ježatka, oves hluchý, pýr,...).

Později seté kukuřice, které jsou ve fázi 2-4 listů kukuřice a nejsou zapleveleny již silně přerostlými plevely, lze nejlépe odplevelit **aplikací jednou z nejrozšířenějších kombinací Story 0,3lt/ha + Balaton Plus 3lt/ha.** Tato kombinace vyřeší celé spektrum dvouděložných plevelů a svými rezidui zabrání následnému zaplevelení kukuřice po dobu několika týdnů.

Přeji hezký den.

